DATI PROVA UFFICIALE

Applicazione

IL SILACID nella provava è stato impiegato in pre raccolta ,per ridurre l'umidità su grappolo ed il micro cracking , da solo e in miscela con AA, con l'obiettivo di aumentare la resistenza ai marciumi del grappolo.



ACCRESCIMENTO | CHIUSURA GRAPPOLO | PRE INVAIATURA | INVAITATURA

SILACID 3,5 Kg/ha

MATERIALI | METODO

COLTURA /VARIETA	UVA DA TAVOLA -RED GLOBE
DISEGNO SPERIMENTALE	BLOCCHI RANDOMIZZATI
INIZIO PROVA	AGOSTO 2017
VOLUME ACQUA/HA	1000 lt

PROTOCOLLO SPERIMENTALE

	A 08/09/2017 INIZIO INVAIATURA	B 15/09/2017 INVAITURA	C 23/09/2017 IVAIATURA	D 4/10/2017 PRE RACCOLTA
SILACID AMINOACIDI VEG	3 kg/ha 1,5 lt/ha	3 kg/ha 1,5 lt/ha	3 kg/ha 1,5 lt/ha	3 kg/ha 1,5 lt/ha
SILACID	8 kg/ha	8 kg/ha	8 kg/ha	8 kg/ha
ANTIBOTRITICO BICARBONATO DI POTASSIO	0,8 kg/ha -----	0,8 kg/ha -----	---- 5 Kg/ha	---- 5 Kg/ha
TESTIMONE	Test non trattato			



SILACID TESTIMONE

Gamma SHIELD

VIVO

www.vivo-bio.it

VIVO è un brand
RAGGIOVERDE SRL

SILACID

CORROBORANTE

PROVA UFFICIALE

UVA DA TAVOLA

INCREMENTO RESISTENZA AI MARCIUMI DEL GRAPPOLO E TENUTA IN POST RACCOLTA




Modalità d'azione

Riduce l'umidità della superficie trattata ed apporta Silicio Biodisponibile, questo si accumula nei tessuti in accrescimento e si lega alla parete cellulare, formando un barriera fisica naturale chiamata "SILICA CELLS". Lo strato protettivo formato dal deposito di silicio incrementa la resistenza ai fungi patogeni, aumenta l'elasticità della buccia e riduce il cracking dei frutti.

SILACID Corroborante naturale


Fortifica e irrobustisce le piante



RISULTATI PROVE UFFICIALI


AUMENTO DELL'INTEGRITA' DEL GRAPPOLO ALLA RACCOLTA

L'utilizzo del SILACID da solo e in miscela con gli AA, che aumentano l'assorbimento dell'elemento (SI), durante l'accrescimento dell'acino, ha incrementato la resistenza al Marciume del grappolo alla raccolta.



PRODOTTO NON IDONEO ALLA VENDITA' DOPO LA CONSERVAZIONE

IL SILACID da solo, o in combinazione con gli AA, a dosaggio ridotto, ha notevolmente aumentata la protezione del grappolo dai marciumi secondari in post raccolta. Dopo 28 gg di frigoconservazione, ha dimezzato le perdite e aumentato la quota di prodotto commerciabile



AUMENTO RESISTENZA AI MARCIUMI IN POST RACCOLTA

L'applicazione del SILACID su grappolo in pre-raccolta favorisce la riduzione dello sviluppo dei Marciumi primari come la Botrite nella fase di post raccolta aumentando la quota di prodotto commerciabile.

