Gamma ADVANCE

POWERED BY PRO BIO TECH

TRICOBOOST

PROBIOTICO
Inoculo di funghi micorrizici

Contenuto in funghi micorrize 0,1%
Contenuto in Trichoderma asperellum (ceppo IAB/01) 1x 10^7CFU/gr
Contenuto in batteri della rizosfera (Bacillus, Pseudomonas spp) 1x 10^5CFU/gr
Estratto vegetale PRE-BIOTICO

Attività

TRICOBOOST è un “Biostimolante” ad azione specifica su suolo costituitò da un consorzio Microbico selezionato contenente il ceppo di **Trichoderma spp IAB/01 Micorrize** e **Batteri della rizosfera** con composti PREBIOTICI attivi. Il ceppo di Trichoderma spp IAB/01, che è unico ed esclusivo, viene selezionato per il suo effetto biostimolante, che lo rende completamente differente da altri ceppi simili presenti sul mercato ed è registrato in Spagna come “biostimolante” nel **MAPA** (Ministerio de Agricultura Pesca & Aliment.) . L’azione sinergica del pool di Microrganismi del TRICOBOOST ha una duplice azione: stimola. Il metabolismo e lo sviluppo radicale e aumenta la resistenza ai stress biotici.

- ✔ Migliora lo sviluppo radicale e l’esplorazione del suolo durante tutto il ciclo produttivo
- ✔ Aumenta la resistenza alle avversità telluriche, colonizzazione delle nicchie ecologiche
- ✔ Incrementa l’assorbimento e la produttività

VIVO

www.vivo-bio.it

VIVO è un brand
RAGGIOVERDE SRL

+ NUTRIZIONE

Stimola il Metabolismo producendo diversi tipi di metaboliti secondari che favoriscono lo sviluppo della radice durante tutto il ciclo di coltivazione, libera composti fosforati bloccati nel suolo e aumenta l'assorbimento. Aumenta la resistenza agli stress biotici grazie alla competizione di spazio e nutrimento con i patogeni tellurici. L'attività del TRICOBOOST è amplificate dalla presenza di sostanze PREBIOTICHE , che facilitano lo sviluppo del Consorzio Microbico velocizzando l'azione del formulato.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

TRICOBOOST è specialmente indicato per applicazioni al suolo attraverso fertirrigazione in ogni tipo di coltivazione. Si consiglia realizzare varie applicazioni a partire dalle fasi iniziali del ciclo, dopo il trapianto o all' inizio della fase di sviluppo vegetativo.

COLTURE	DOSAGGIO FERTIRRIGAZIONE	PERIODO DI APPLICAZIONE
Drupacee Pomacee Actinidia e Vite	1-2 kg / ha	Da effettuarsi al momento dell'impianto o alla ripresa vegetativa e ripetere a distanza max di 1 mese
Orticole	1 kg /ha	Post trapianto o semina ripetere a distanza di 15 gg e se necessario fare un 3 intervento dopo un mese
Fragola	0,5-1 kg /ha	Post trapianto-Semina, 2-3 interventi fino alla fioritura
Preparazione substrati	200gr/m^3	Mescolare al substrato in modo uniforme
Piantine in vivaio	100gr/ 10.000 alveoli	Se necessario ripetere l'intervento dopo il trapianto in campo ad 1 kg/ha

Prodotto utilizzabile in Agricoltura Biologica ai sensi del Regolamento (CE) No 834/2007, sulla produzione e l'etichettatura dei prodotti biologici, successive modifiche ed estensioni.
No registro Control Union: CU 856754

Vivo è un marchio:
RAGGIOVERDE s.r.l.
Via della Pace, 22 - Roccapiemonte (Sa) Italy
www.raggioverdeweb.it - info@raggioverdeweb.it

Confezioni: 0,5-1-5 Kg